



**ANESTEZIOLOGICKÝ DOTAZNÍK**

Jméno, příjmení ..... titul ..... r.č. ....

1.  ANO  NE **Jsem alergická.**

Pokud ANO, na jaké látky nebo léky .....  
a moje alergie se projevuje takto: .....

2.  ANO  NE **Jsem trvale léčena pro chronické nebo akutní onemocnění srdce, plic, jater, ledvin, centrálního nervového systému, pro cukrovku nebo jiná onemocnění.**

Pokud ANO, prosím upřesněte: .....  
.....

3.  ANO  NE **Dlouhodobě užívám léky.**

Pokud ANO, jaké .....

4.  ANO  NE **Jsem závislá na návykových látkách nebo alkoholu.**

Pokud ANO, na kterých.....

5.  ANO  NE **Jsem kuřák.** Za den vykouřím ..... cigaret

6.  ANO  NE **Mám časté bolesti hlavy.**

Jejich pravděpodobnou příčinou je .....  
Léčím je takto: .....

7.  ANO  NE **Mám bolesti zad.**

Jejich pravděpodobnou příčinou je .....

8.  ANO  NE **Dělají se mi snadno modřiny.**

ANO  NE **Krvácím z drobných ran neobvykle dlouho**

Mám tuto poruchu krevní srážlivosti:.....

9.  ANO  NE **V minulosti jsem již podstoupila celkovou anestezii.**

ANO  NE **V minulosti jsem již podstoupila epidurální /“spinální“ anestezii.**

V jejím průběhu došlo k těmto komplikacím: .....

Rozuměla jsem všem otázkám v tomto dotazníku a prohlašuji, že jsem na položené otázky odpověděla pravdivě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Dne..... Podpis .....

**POROD Z POHLEDU ANESTEZIOLOGA – INFORMACE PRO RODIČKY**

Při normálním průběhu porodu se rodička často s anesteziologem vůbec nesetká. Výjimkou je, přeje-li si epidurální analgezií ke zmírnění porodních bolestí, nebo pokud se spontánní porod zkomplikuje a je proveden císařský řez, manuálně vybat placentu nebo po porodu zrevidovat porodní cesty, např. při krvácení. V těchto případech je pak přítomnost anesteziologa nezbytná.

Tyto zákroky je nutno provést v anestezii. Buď v anestezii místní = svodné (je-li na ni čas a podmínky nebo má-li již rodička zavedený epidurální katetr) nebo v anestezii celkové. Typ anestezie se v těchto případech přizpůsobuje stavu rodičky i dítěte. Pokud rodička nemá již zavedený epidurální katetr, tak vzhledem k nedostatku času bývá výrazně častěji nutná celková anestezie. Anesteziolog potřebuje od rodičky narychlo vědět následující informace:

- ❖ Zda je alergická na nějaký lék, především anestetika a antibiotika
- ❖ Kdy naposledy jedla a pila
- ❖ Zda se léčí nebo léčila pro nějaké vážnější onemocnění
- ❖ Zda měla někdy nějaké komplikace v souvislosti s anestezii

Protože dopředu se nedá odhadnout, zda v průběhu spontánního porodu či po něm bude nebo nebude nutný operační výkon, doporučuje se dodržovat určitá pravidla, která zvýší bezpečnost případné anestezie a sníží rizika komplikací. Nejzávažnějším problémem při akutně podané anestezii bývá plný žaludek rodičky (hrozí zvracení a vdechnutí žaludečního obsahu do plic). Proto by během porodu neměla rodička nic jíst. Pití je naopak vhodné, doporučuje se neperlivá voda / minerálka, i ochucená, případně slabě oslazený čaj. Pít je potřeba „ málo, ale často“, to znamená po malých doušcích vypít přibližně 200 ml v průběhu celé hodiny. V žádném případě nepít sycené („bublinkové“) vody, kyselé džusy, mléko.

Protože v náhlých situacích nebývá vždy dostatek času k podrobnému vysvětlování, natož na zodpovězení všech případných dotazů, je vhodné, aby se rodička s maximem informací seznámila předem, a vyplnila anesteziologický dotazník. A to i v případech, kdy dopředu nejsou žádné komplikace očekávány či si rodička nepřeje využít možnosti epidurální analgezie.

**Závěrem**

Jakékoliv další dotazy týkající se anestezie či analgezie v průběhu porodu Vám jistě rádi zodpoví anesteziolog nebo Váš porodník.

**Anesteziologové TN**