

ANESTEZIOLOGICKÝ DOTAZNÍK

Jméno, příjmení.....titul.....r.č.

1. ANO NE **Jsem alergická.**

Pokud ANO, na jaké látky nebo léky

a moje alergie se projevuje takto:

2. ANO NE **Jsem trvale léčena pro chronické nebo akutní onemocnění srdce, plic, jater, ledvin, centrálního nervového systému, pro cukrovku nebo jiná onemocnění.**

Pokud ANO, prosím upřesněte:

.....

3. ANO NE **Dlouhodobě užívám léky.**

Pokud ANO, jaké

4. ANO NE **Jsem závislá na návykových látkách nebo alkoholu.**

Pokud ANO, na kterých

5. ANO NE **Jsem kuřák. Za den vykouřím..... cigaret**

6. ANO NE **Mám časté bolesti hlavy.**

Jejich pravděpodobnou příčinou je

Léčím je takto:

7. ANO NE **Mám bolesti zad.**

Jejich pravděpodobnou příčinou je

8. ANO NE **Dělají se mi snadno modřiny.**

ANO NE **Krvácím z drobných ran neobvykle dlouho**

Mám tuto poruchu krevní srážlivosti:

9. ANO NE **V minulosti jsem již podstoupila celkovou anestezii.**

ANO NE **V minulosti jsem již podstoupila epidurální /“ spinální“ anestezii.**

V jejím průběhu došlo k těmto komplikacím:

Rozuměla jsem všem otázkám v tomto dotazníku a prohlašuji, že jsem na položené otázky odpověděla pravdivě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Dne

Podpis

POROD Z POHLEDU ANESTEZIOLOGA – INFORMACE PRO RODIČKY

Při normálním průběhu porodu se rodička často s anesteziologem vůbec nesetká. Výjimkou je, přeje-li si epidurální analgezií ke zmírnění porodních bolestí, nebo pokud se spontánní porod zkomplikuje a je provést císařský řez, manuálně vybavit placentu nebo po porodu zrevidovat porodní cesty, např. při krvácení. V těchto případech je pak přítomnost anesteziologa nezbytná.

Tyto zákroky je nutno provést v anestezii. Buď v anestezii místní = svodné (je-li na ni čas a podmínky nebo má-li již rodička zavedený epidurální katetr) nebo v anestezii celkové. Typ anestezie se v těchto případech přizpůsobuje stavu rodičky i dítěte. Pokud rodička nemá již zavedený epidurální katetr, tak vzhledem k nedostatku času bývá výrazně častěji nutná celková anestezie. Anesteziolog potřebuje od rodičky narychlo vědět následující informace:

- ❖ zda je alergická na nějaký lék, především anestetika a antibiotika
- ❖ kdy naposledy jedla a pila
- ❖ zda se léčí nebo léčila pro nějaké vážnější onemocnění
- ❖ zda měla někdy nějaké komplikace v souvislosti s anestezii

Protože dopředu se nedá odhadnout, zda v průběhu spontánního porodu či po něm bude nebo nebude nutný operační výkon, doporučuje se dodržovat určitá pravidla, která zvýší bezpečnost případné anestezie a sníží rizika komplikací. Nejvážnějším problémem při akutně podané anestezii bývá plný žaludek rodičky (hrozí zvracení a vdechnutí žaludečního obsahu do plic). Proto by během porodu neměla rodička nic jíst. Pití je naopak vhodné, doporučuje se neperlivá voda / minerálka, i ochucená, případně slabě oslazený čaj. Pít je potřeba „ málo, ale často“, to znamená po malých doušcích vypít přibližně 200 ml v průběhu celé hodiny. V žádném případě nepít sycené („bublinkové“) vody, kyselá džusy, mléko.

Protože v náhlých situacích nebývá vždy dostatek času k podrobnému vysvětlování, natož na zodpovězení všech případných dotazů, je vhodné, aby se rodička s maximem informací seznámila předem, a vyplnila anesteziologický dotazník. A to i v případech, kdy dopředu nejsou žádné komplikace očekávány, nebo si rodička nepřeje využít možnosti epidurální analgezie.

Závěrem.....

Jakékoliv další dotazy týkající se anestezie či analgezie v průběhu porodu Vám jistě rád zodpoví anesteziolog, nebo Váš porodník.

Anesteziologové Fakultní Thomayerovy nemocnice